



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
DPD023-Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo
P.zza Torlonia, 90 – 67051 Avezzano

Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture, tel.085.9773532
Sede Villanova di Cepagatti (Pe) 65010
Via Nazionale, 38 Tel 085.9773586 – fax 085.9773581

Villanova di Cepagatti, 17 LUG. 2017

Prot. N. RA/0189941/17

OGGETTO: Disciplinari Produzione Integrata Regione Abruzzo.
Annualità 2017. Scheda Bietola rossa.

Alla AOP
UNOLOMBARDIA
Via A. Cechov, 1
20098 S. Giuliano Milanese- Milano

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio promozione delle filiere
Ufficio politiche di sostegno alla conversione e al
mantenimento di pratiche biologiche in agricoltura, allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
Via Catullo, 17
Pescara

c.a. massimo.salva@aopunolombardia.it

In riferimento alla Vs. richiesta del 03 luglio u.s. si inviano le schede relative al diserbo e
alla difesa della bietola rossa, non presenti nel disciplinare Regionale.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dr. Domenico D'Ascenzo)

Il Dirigente del Servizio
VACAT
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Antonio Di Paolo)

18 LUG. 2017

BIETOLA ROSSA

	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZA ATTIVA	LIMITAZIONI D'USO
<p>Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici:</u> Impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Effettuare ampie rotazioni colturali. Asportare e distruggere i residui infetti. <u>Interventi chimici:</u> Intervenire solo alla comparsa dei sintomi.</p>	<p>Prodotti rameici (1)</p>	<p>(1) I formulati rameici sono utilizzabili per un massimo di 6kg/ha di sostanza attiva per anno</p>
<p>Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici:</u> Ampie rotazioni colturali. <u>Interventi chimici:</u> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi</p>	<p>Prodotti rameici (1)</p>	<p>(1) I formulati rameici sono utilizzabili per un massimo di 6kg/ha di sostanza attiva per anno</p>
<p>Mal del Piede (<i>Phoma betae</i>) Mal vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>) Marciume secco (<i>Rhizoctonia solani</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici:</u> Impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Effettuare ampie rotazioni colturali. Evitare ristagni idrici. Asportare e distruggere le piante infette.</p>	<p><i>Tricoderma asperellum</i> Zolfo</p>	
<p>Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)</p>	<p><u>Interventi chimici:</u> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi</p>	<p>Deltametrina (1) Tau fluvialinate (1) Cipermetrina (1)</p>	<p>(1) I piretroidi possono essere utilizzati per un massimo di 1 trattamento indipendentemente dall'avversità</p>
<p>Afidi (<i>Aphis fabae</i>) (<i>Myzus persicae</i>)</p>	<p><u>Intervenire alla prima comparsa</u></p>	<p>Piretrine pure</p>	
<p>Mosca minatrice (<i>Iriomyza</i> spp.)</p>	<p>Impiegare trappole cromotropiche gialle per la cattura degli adulti</p>	<p>Piretrine pure Deltametrina (1)</p>	<p>(1) I piretroidi possono essere utilizzati per un massimo di 1 trattamento indipendentemente dall'avversità</p>
<p>Mosca (<i>Pegomya betae</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici:</u> asportare e distruggere le foglie infestate <u>Interventi chimici:</u> intervenire tempestivamente in presenza delle prime mine</p>	<p>Piretrine pure</p>	
<p>Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.)</p>	<p><u>Interventi chimici:</u> In presenza dei primi attacchi</p>	<p>Piretrine pure</p>	

<p>Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>, <i>Mamestra</i> <i>brassicarum</i>, <i>Autographa gamma</i>)</p>	<p>Soglia: presenza</p>	<p>Deltametrina (1) Tau fluvialinate (1) Cipermetrina (1) <i>Bacillus thuringiensis</i></p>	<p>(1) I piretroidi possono essere utilizzati per un massimo di 1 trattamento indipendentemente dall'avversità</p>
--	-------------------------	---	--

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	Note
Pre semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate	Formulati al 30,4% dose massima 3 l/ha
Pre-emergenza	Dicotiledoni	Cloridazon (1) Metamitron (2)	(1) Al massimo 2,6 kg./ha di s.a. ogni 3 anni (2) Carenza 45 gg.
Post-emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifan	