
















## Legenda


































### Livelli cartografici:

#### Carta Tipologico-Forestale della Regione Abruzzo - Categorie


##### CATEGORIE

-  Arbusteti
-  Castagneti
-  Cerrete
-  Conifere varie, pure o miste
-  Faggete
-  Formazioni riparie
-  Latifoglie varie, pure o miste
-  Leccete
-  Orno-ostrieti
-  Pineta di Villetta Barrea
-  Pineta naturale di Pino nero di Villetta Barrea
-  Querceti di Roverella
-  Robinieto-ailanteti

#### Carta Tipologico-Forestale della Regione Abruzzo - Tipologie

-  Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili
-  Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e sub
-  Arbusteto a prevalenza di ginestre
-  Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo
-  Arbusteto a prevalenza di specie della macchia macchia
-  Boscaglia pioniera calanchiva
-  Boschi di forra
-  Castagneto (neutrofilo-acidofilo)
-  Castagneto da frutto
-  Cerreta mesofila
-  Cerreta mesoxerofila
-  Faggeta altomontana rupestre
-  Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)
-  Faggeta termofila e basso montana
-  Latifoglie di invasione miste e varie
-  Lecceta costiera termofila
-  Lecceta mesoxerofila
-  Lecceta rupicola
-  Mugheta appenninica
-  Orno-ostrieto pioniero
-  Ostrieto mesofilo
-  Ostrieto mesoxerofilo
-  Pineta naturale di Pino nero di Villetta Barrea
-  Pioppeto di pioppo tremulo
-  Pioppo-saliceto ripariale
-  Querceto a roverella pioniero
-  Querceto a roverella tipico
-  Querceto di roverella mesoxerofilo
-  Rimboschimento di conifere mediterranee
-  Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e subm
-  Rimboschimento di conifere nella fascia montana
-  Robinieto-ailanteto
-  Variante abete bianco

Italia Centrale  
non disponibile



Portale Web Regione Abruzzo 2013

Sistema di Riferimento:  
WGS84 UTM 33

Coordinate di Stampa:  
N.O.: X: 442.905,84 Y: 4.680.912,38  
S.E.: X: 444.745,49 Y: 4.678.447,52

Data di Stampa: 09/12/2021

Scala: 13.000

Formato: A4 - V

Estratto da: GeoPortale della Regione Abruzzo  
Fonte dei dati: <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>  
Limitazioni d'uso:



1639044530210